

厚生労働省新型コロナワクチンQ&A（抜粋）

※全体は以下のページにおいて閲覧可能

<https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/>

【目次】

ワクチンの安全性と副反応

- Q これまでに認められている副反応にはどのようなものがありますか。
- Q ワクチンを受けた後に熱が出たら、どうすれば良いですか。
- Q ワクチンを受けた後の発熱や痛みに対し、市販の解熱鎮痛薬を飲んでもよいですか。
- Q アナフィラキシーではどのような症状が出ますか。治療法はありますか。
- Q 高齢者で一番多い副反応は何でしょうか。

接種後の生活

- Q ワクチン接種後、生活上で注意することはありますか。
- Q ワクチンを接種した日は、車を運転できますか。

Q これまでに認められている副反応にはどのようなものがありますか。

A 注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み等がみられることがあります。まれな頻度でアナフィラキシー（急性のアレルギー反応）が発生します。


現在、日本で接種が進められている新型コロナワクチンでは、接種後に注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢、発熱等がみられることがあります。こうした症状の大部分は、接種後数日以内に回復しています。（ファイザー社のワクチンにおける臨床試験の主な結果は[こちら](#)、武田／モデルナ社のワクチンにおける臨床試験の主な結果は[こちら](#)、接種開始後の健康状況調査の結果は[こちら](#)）

発現割合	症状
50%以上	接種部位の痛み、疲労、頭痛
10～50%	筋肉痛、悪寒、関節痛、下痢、発熱、接種部位の腫れ
1～10%	吐き気、嘔吐

コミナティ®(ファイザー社) 添付文書より改編

その他のワクチン(アストラゼネカ社、ノババックス社が開発中のワクチン等)でも、ワクチン接種後に、ワクチン接種と因果関係がないものも含めて、接種部位の痛みや、頭痛・倦怠感・筋肉痛等の症状がみられたことが論文等で報告されています。（詳細は、[副反応に関する審議会資料](#) をご覧ください。）

また、稀な頻度でアナフィラキシー（急性のアレルギー反応）が発生したことが報告されています。アナフィラキシーの報告状況等は、[こちら](#) に掲載しています。もし、アナフィラキシーが起きたときには、接種会場や医療機関ですぐに治療を行うことになります。



新型コロナウイルスについて

Q ワクチンを受けた後に熱が出たら、どうすれば良いですか。

A ワクチンによる発熱は接種後1～2日以内に起こることが多く、必要な場合は解熱鎮痛剤を服用するなどして、様子を見ていただくことになります。

ワクチンによる発熱は接種後1～2日以内に起こることが多く、必要な場合は解熱鎮痛剤を服用いただくなどして、様子を見ていただくことになります。このほか、ワクチン接種後に比較的起きやすい症状としては、頭痛、疲労、筋肉痛、悪寒(さむけ)、関節痛などがあります。

ワクチンによる発熱か、新型コロナウイルス感染症かを見分けるには、発熱以外に、咳や咽頭痛、味覚・嗅覚の消失、息切れ等の症状がないかどうか、手がかりとなります。(ワクチンによる発熱では、通常、これらの症状はみられません。)

ワクチンを受けた後、2日間以上熱が続く場合や、症状が重い場合、ワクチンでは起こりにくい上記の症状がみられる場合には、医療機関等への受診や相談をご検討ください。

新型コロナワクチンコールセンター

電話番号 (フリーダイヤル)

0120-761770

対応言語

日本語・英語・中国語・韓国語

ポルトガル語・スペイン語・タイ語・ベトナム語

受付時間(土日・祝日も実施)

日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語 9時00分～21時00分

タイ語 9時00分～18時00分

ベトナム語 10時00分～19時00分

聴覚に障害のある方は、一般財団法人全日本ろうあ連盟ホームページをご覧ください。

法人番号6000012070001

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

電話番号 03-5253-1111(代表)

Copyright © Ministry of Health, Labour and Welfare, All Rights reserved.



新型コロナウイルスについて

Q ワクチンを受けた後の発熱や痛みに対し、市販の解熱鎮痛薬を飲んでもよいですか。

A ワクチンを受けた後の発熱や痛みに対し、市販の解熱鎮痛薬で対応いただくことも考えられますが、特に下記のような場合は、主治医や薬剤師にご相談ください。

ワクチンを受けた後の発熱や痛みに対し、市販の解熱鎮痛薬で対応いただくことも考えられますが、特に下記のような場合は、主治医や薬剤師にご相談ください。

- ・他のお薬を内服している場合や、病気治療中の場合
- ・激しい痛みや高熱など、症状が重い場合や、症状が長く続いている場合
- ・ワクチン接種後としては典型的でない症状がみられる場合（ワクチン接種後に起こりやすい症状や起こりにくい症状については、[こちら](#) をご覧ください。）

なお、ワクチンを受けた後、症状が出る前に、解熱鎮痛薬を予防的に繰り返し内服することについては、現在のところ推奨されていません。

(参考資料)

[Interim Clinical Considerations for Use of COVID-19 Vaccines Currently Authorized in the United States](#)

(米国CDCのmRNAワクチン使用に関する暫定的見解)

新型コロナワクチンコールセンター

電話番号 (フリーダイヤル)

0120-761770

対応言語

日本語・英語・中国語・韓国語

ポルトガル語・スペイン語・タイ語・ベトナム語


受付時間 (土日・祝日も実施)

日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語 9時00分～21時00分

タイ語 9時00分～18時00分

ベトナム語 10時00分～19時00分

聴覚に障害のある方は、一般財団法人全日本ろうあ連盟ホームページをご覧ください。



新型コロナウイルスについて

Q アナフィラキシーではどのような症状が出ますか。治療法はありますか。

A 皮膚症状、消化器症状、呼吸器症状が急に起こり、血圧低下や意識レベルの低下を伴う場合もあります。薬の注射などで治療します。

薬や食物が身体に入ってから、短時間で起きることのあるアレルギー反応です。

じんま疹などの皮膚症状、腹痛や嘔吐などの消化器症状、息苦しさなどの呼吸器症状が急に起こります。血圧低下や意識レベルの低下(呼びかけに反応しない)を伴う場合を、アナフィラキシーショックと呼びます。

アナフィラキシーは特定のワクチンだけに起きるものではなく、様々な医薬品やワクチンの投与後に報告されています。例えば、インフルエンザワクチン接種後の副反応疑い報告では、因果関係があるかどうか分からないものも含め、1シーズンで、約20件のアナフィラキシーが報告されています。

予防接種後に、息苦しさなどの呼吸器症状がみられれば、接種会場や医療機関で、まず、アドレナリン(エピネフリン)という薬の注射を行います。その後、症状を軽くするために、気管支拡張薬等の吸入や抗ヒスタミン薬、ステロイド薬の点滴や内服なども行います。

接種後にもアナフィラキシーが起こっても、すぐに対応が可能なよう、予防接種の接種会場や医療機関では、医薬品などの準備をしています。

新型コロナワクチンコールセンター

電話番号(フリーダイヤル)

0120-761770

対応言語

日本語・英語・中国語・韓国語

ポルトガル語・スペイン語・タイ語・ベトナム語

受付時間(土日・祝日も実施)

日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語 9時00分～21時00分

タイ語 9時00分～18時00分

ベトナム語 10時00分～19時00分

聴覚に障害のある方は、一般財団法人全日本ろうあ連盟ホームページをご覧ください。

法人番号6000012070001

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2



Q 高齢者で一番多い副反応は何でしょうか。 | NEW |

A 高齢者で一番多い副反応は、若年者同様、接種部位の痛みです。

日本で承認されているファイザー社のワクチンに関して、一番多い副反応は接種部位の痛みです。海外の臨床試験では7割程度の高齢者に起こるとの結果が出ています。これは高齢者で注意が必要な症状というわけではなく、また、若年者よりも少し頻度が低いとされています。武田／モデルナ社のワクチンに関して、一番多い副反応は接種部位の痛みとなっています。

その他、頻度の高い副反応として、倦怠感、頭痛、悪寒、筋肉痛、関節痛などが起こることがありますが、たいてい数日以内で良くなることが分かっています。いずれの有害事象も、高齢者で発生頻度が上がっているというものではありません。

(参考資料)

[Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine](#)

(mRNA Covid-19 ワクチン BNT162b2 の安全性と有効性)

[PMDAの審査報告書\(ファイザー社のワクチン\)](#)

[PMDAの審査報告書\(武田／モデルナ社のワクチン\)](#)

新型コロナワクチンコールセンター

電話番号 (フリーダイヤル)

0120-761770

対応言語

日本語・英語・中国語・韓国語

ポルトガル語・スペイン語・タイ語・ベトナム語


受付時間 (土日・祝日も実施)

日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語 9時00分～21時00分

タイ語 9時00分～18時00分

ベトナム語 10時00分～19時00分

聴覚に障害のある方は、一般財団法人全日本ろうあ連盟ホームページをご覧ください。



新型コロナウイルスについて

Q ワクチン接種後、生活上で注意することはありますか。

A ワクチンを接種した後は、接種部位の痛みが出たり、倦怠感、発熱、頭痛や関節痛などが生じることがあります。できるだけ接種当日・翌日に無理をしないですむように予定を立てておくといでしょう。

ワクチンを接種した後は、接種部位の痛みが出たり、倦怠感、発熱、頭痛や関節痛などが生じることがあります。このような症状が出たときのために、できるだけ接種当日や翌日に無理をしないですむように予定を立てておくといでしょう。これらの症状は、たいてい数日以内で軽快することが分かっています。

接種部位については、清潔に保つよう心がけてください。

ワクチンを受けた当日は、激しい運動や過度の飲酒などは控えましょう。接種部位については、清潔に保つよう心がけてください。

新型コロナワクチンコールセンター

電話番号（フリーダイヤル）

0120-761770

対応言語

日本語・英語・中国語・韓国語

ポルトガル語・スペイン語・タイ語・ベトナム語

受付時間（土日・祝日も実施）

日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語 9時00分～21時00分

タイ語 9時00分～18時00分

ベトナム語 10時00分～19時00分

聴覚に障害のある方は、一般財団法人全日本ろうあ連盟ホームページをご覧ください。

法人番号6000012070001

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

電話番号 03-5253-1111(代表)

Copyright © Ministry of Health, Labour and Welfare, All Rights reserved.



新型コロナウイルスについて

Q ワクチンを接種した日は、車を運転できますか。

A ワクチンを接種した後の体調が良好であれば、基本的には運転をしても問題はありません。ただし、体調に不安がある場合は運転を控えることが大切です。

ワクチンを接種した後の体調が良好であれば、基本的には運転をしても問題はありません。ただし、接種部位に痛みが強く出たり、発熱、倦怠感、頭痛や関節痛などの全身性の反応が出たりすることもあり、体調に不安がある場合は運転を控えることが大切です。

新型コロナワクチンコールセンター

電話番号 (フリーダイヤル)

0120-761770

対応言語

日本語・英語・中国語・韓国語

ポルトガル語・スペイン語・タイ語・ベトナム語

受付時間 (土日・祝日も実施)

日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語 9時00分～21時00分

タイ語 9時00分～18時00分

ベトナム語 10時00分～19時00分

聴覚に障害のある方は、一般財団法人全日本ろうあ連盟ホームページをご覧ください。

法人番号6000012070001

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

電話番号 03-5253-1111(代表)

Copyright © Ministry of Health, Labour and Welfare, All Rights reserved.